

Präsentation der Statistik von Dr. Philip Jaury, Allgemeinmedizin,  
Associate Professor für Medizin an der Universität Paris 5 und Arzt  
von Constance Alexander

Diese Studie umfasste 84 Patienten (41% Frauen), gefolgt mehr als vier Monate.  
Ergebnisse:

59% der Patienten geworden "nüchtern"

30% der Patienten mit Reduktion von über 50% ihres Verbrauchs:  
Verbrauch Abstieg in potenziell nicht-toxischen Dosen etablierten WHO: drei Drinks pro  
Tag für Männer und zwei Getränke für Frauen.

11% Ausfall.

Auf einer Skala von Begierde wie der Schmerz von 1 bis 10 festgelegt, vor der  
Behandlung mit Baclofen hatte eine mittlere von 8,26 nach dem Durchschnitt beträgt 1,28  
Der durchschnittliche effektive Dosis beträgt 136 mg / Tag

Der Alkohol vor der Behandlung durchschnittlich 140 g Alkohol pro Tag.

32% hatten Naltrexon oder Acamprosat versucht.

36% hatten Behandlungen mit Medikamenten.

1 allein hatte eine Heilung ohne Medikamente.

15 Patienten wurden die Patienten als "naiv" nie folgen andere Behandlungen bekannt.

Daten aus der Nebenwirkungen:

25% haben keine Nebenwirkungen hatte

75% hatten eine oder mehrere Nebenwirkungen:

- Müdigkeit und Schläfrigkeit über 14%, häufig vorübergehende  
verschwinden nach ein paar Wochen. Wenn Müdigkeit bleibt  
Dr. Philip Jaury vorgeschrieben die Adrafinil dass sehr gut funktioniert.
- Schlaflosigkeit (oder eher eine Reduzierung der Schlafdauer ohne Ermüdung findet) auf  
8%
- Schwindel
- eine Änderung der Ernährung, mehr wie weniger
- Konzentrationsstörungen
- Verdauungsstörungen
- Kopfschmerzen
- Hypomanie bei 5,3%
- Übelkeit und Erbrechen bei Domperidon nachgelassen
- Gewichtsverlust
- Sexuelle Störungen: gesteigerte Libido, anders als  
hat oft über die Baclofen gesagt worden
- Verwirrtheit
- Hitzewallungen
- Parästhesien 3,7%
- Gelenkschmerzen
- Fangmenge
- einige Störungen der Sprache und ein paar Ausschläge.